

**VEUILLEZ LIRE CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE  
VOTRE MÉDICAMENT.  
RENSEIGNEMENTS POUR LE PATIENT SUR LE MÉDICAMENT**

**PrCEPHALEXIN**

Comprimés de céfalexine

500 mg

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à recevoir CEPHALEXIN et chaque fois que votre ordonnance est renouvelée. Ce feuillet est un résumé et il ne contient donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de ce produit. Discutez avec votre professionnel de la santé de votre maladie et de votre traitement et demandez-lui si de nouveaux renseignements sur CEPHALEXIN sont disponibles.

**Pourquoi utilise-t-on CEPHALEXIN?**

- CEPHALEXIN peut être indiqué pour le traitement de certaines infections bactériennes :
  - des voies respiratoires,
  - des oreilles (otite moyenne),
  - des voies génito-urinaires,
  - des os et des articulations,
  - de la peau et des tissus mous.
- Les antibactériens comme CEPHALEXIN sont destinés uniquement au traitement des infections bactériennes. Ils ne doivent pas être employés pour traiter les infections virales, telles que le rhume de cerveau.

**Comment CEPHALEXIN agit-il?**

CEPHALEXIN est un antibiotique qui agit de la façon suivante :

- Il arrête la croissance des bactéries;
- Il tue les bactéries.

**Quels sont les ingrédients de CEPHALEXIN?**

Ingrédient médicamenteux : Monohydrate de céfalexine

Ingrédients non-médicinaux : Glycolate d'amidon sodique, cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, hypromellose, dioxyde de titane, macrogol et laque d'aluminium FCF jaune n° 6 AD&C jaune orangé.

**Sous quelle forme se présente CEPHALEXIN?**

Comprimés de céfalexine BP à 500 mg.

**Ne prenez pas CEPHALEXIN dans le cas suivant :**

- Vous êtes allergique à la céfalexine, aux antibiotiques de la famille des céphalosporines ou à tout autre ingrédient de CEPHALEXIN.

**Pour éviter les effets secondaires et assurer une utilisation optimale de CEPHALEXIN, consultez votre professionnel de la santé avant de prendre ce médicament. Parlez-lui de votre état de santé ou des problèmes que vous éprouvez, y compris dans les circonstances suivantes :**

- Vous êtes allergique ou réagissez mal aux pénicillines ou à d'autres antibiotiques;
- Vous avez des problèmes entériques ou intestinaux;
- Vous avez des problèmes rénaux;
- Vous êtes enceinte ou avez l'intention de le devenir;
- Vous allaitez ou avez l'intention de le faire.

Autres mises en garde importantes à connaître :

- L'utilisation d'un antibiotique comme CEPHALEXIN peut causer la diarrhée associée à *Clostridium difficile* (DACD). Voir « Effets secondaires graves en mesures à prendre », ci-dessous.
- CEPHALEXIN peut compromettre les résultats de certaines analyses de sang et d'urine. Mentionnez à votre médecin que vous prenez CEPHALEXIN si vous devez subir une analyse sanguine ou urinaire pendant que vous êtes sous traitement.

**Informez votre professionnel de la santé de tous les produits de santé que vous prenez y compris : médicaments, vitamines, minéraux, suppléments naturels ou produits de médecine douce.**

**Comment prendre CEPHALEXIN :**

- Prenez CEPHALEXIN oralement, l'estomac vide;
- Même si votre état s'améliore au début du traitement, vous devez utiliser CEPHALEXIN exactement comme il vous a été prescrit;
- Un mauvais usage ou un usage abusif de CEPHALEXIN pourrait amener la croissance de bactéries qui ne seront pas tuées par CEPHALEXIN (résistance). Cela signifie que CEPHALEXIN pourrait ne plus être efficace pour vous à l'avenir;
- Ne donnez pas votre médicament à quelqu'un d'autre.

**Dose habituelle :**

**Adultes :**

La posologie pour un adulte varie entre 1 et 4 g par jour en doses fractionnées. La posologie normale pour un adulte est de 1 g par jour en doses fractionnées administrées toutes les 6 heures.

**Enfants :**

La posologie quotidienne recommandée pour les enfants est de 25 à 50 mg/kg/jour en doses fractionnées administrées toutes les 6 heures.

**Surdosage :**

Les symptômes d'une surdose orale peuvent inclure les suivants :

- Nausée;
- Vomissements;
- Douleurs abdominales;
- Diarrhée;
- Sang dans les urines.

Si vous croyez avoir reçu une trop grande quantité de CEPHALEXIN, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même si vous n'avez aucun symptôme.

**Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à CEPHALEXIN?**

Cette liste ne renferme pas tous les effets secondaires que vous pourriez ressentir pendant que vous prenez CEPHALEXIN. Si vous présentez un effet secondaire qui ne figure pas sur cette liste, parlez-en avec votre professionnel de la santé.

Vous pourriez présenter de la diarrhée, des nausées, des vomissements, des selles molles, des douleurs abdominales, un érythème fessier, une vaginite ou des pertes blanches, des étourdissements, de la fatigue, des maux de tête, des symptômes d'agitation, de confusion ou d'hallucination, ou d'autres symptômes que vous ne comprenez pas. Vous devriez mentionner le plus tôt possible à votre professionnel de la santé les symptômes que vous avez observés, le cas échéant.

Des cas de vertige (perte d'équilibre ou instabilité), d'acouphène (bourdonnement d'oreilles), de perte auditive et de modification du comportement ont été signalés chez de jeunes enfants.

CEPHALEXIN peut également causer des effets comme le jaunissement du blanc des yeux ou de la peau (ictère) ou une inflammation du foie (hépatite).

<b>Effets secondaires graves : fréquence et procédure à suivre</b>			
<b>Symptôme / effet</b>	<b>Consultez votre professionnel de la santé</b>		<b>Cessez de prendre le médicament et obtenez sans tarder des soins médicaux</b>
	<b>Dans les cas graves seulement</b>	<b>Dans tous les cas</b>	
<b>RARE</b>			
Symptômes d'une grave inflammation de la muqueuse intestinale (colite à <i>Clostridium difficile</i> ) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Diarrhée persistante;</li> <li>• Diarrhée sanglante ou aqueuse;</li> <li>• Douleurs abdominales ou crampes d'estomac</li> <li>• Selles glaireuses ou sanguinolentes.</li> </ul>			√
Graves réactions cutanées : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Éruption cutanée pouvant causer des ampoules et des lésions ressemblant à de petites cibles (taches au centre foncé entouré d'une région plus pâle, elle-même entourée d'un anneau foncé);</li> <li>• Éruption cutanée étendue s'accompagnant d'ampoules et de surfaces de peau qui pèlent sur la plupart des régions du corps, en particulier autour de la bouche, du nez, des yeux et des organes génitaux.</li> </ul>			√
Effets indésirables cutanés graves (graves réactions cutanées qui peuvent également affecter d'autres organes) : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desquamation de la peau ou formation de cloques (avec ou sans pus) pouvant aussi affecter vos yeux, votre bouche, votre nez ou vos organes génitaux, démangeaisons, éruption cutanée grave, bosses sous la peau, peau douloureuse, changement de couleur de la peau (rougeurs, jaunissement, violacée)</li> <li>• Enflure et rougeur des yeux ou du visage</li> <li>• Symptômes pseudogrippaux, fièvre, frissons, courbatures, ganglions enflés, toux</li> <li>• Essoufflement, douleur thoracique ou inconfort</li> </ul>			√

Si vous présentez un symptôme incommodant ou ressentez un effet secondaire qui n'est pas mentionné ici ou qui s'aggrave au point de nuire à vos activités quotidiennes, adressez-vous à votre professionnel de la santé.

### **Déclaration des effets secondaires**

Vous pouvez déclarer à Santé Canada les effets secondaires qu'on soupçonne d'être associés à l'utilisation d'un produit de santé de l'une des deux façons suivantes :

- En visitant la page Web consacrée à la déclaration des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par la poste ou par télécopieur; ou
- En composant sans frais le 1-866-234-2345.

*REMARQUE : Consulter votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.*

### **Conservation :**

Conserver à une température ambiante contrôlée (de 15 °C à 30 °C).  
Garder hors de la vue et de la portée des enfants.

### **Si vous voulez de plus amples renseignements à propos de CEPHALEXIN :**

- Consultez votre professionnel de la santé.
- Vous trouverez la monographie complète du produit rédigée pour les professionnels de la santé qui comprend ces Renseignements pour le consommateur en visitant le site web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>); ou en appelant au 1-855-788-3153
- ou au: [www.sivem.ca](http://www.sivem.ca)

Ce dépliant a été rédigé par :

**Sivem Produits Pharmaceutiques ULC**  
4705 rue Dobrin  
Saint-Laurent, Québec, Canada  
H4R 2P7

Date de révision : 28 janvier 2022