

RENSEIGNEMENTS POUR LE PATIENT

PrFAMOTIDINE

Renseignements thérapeutiques complets fournis sur demande aux médecins et aux pharmaciens.

FAMOTIDINE (comprimés de 20 mg et 40 mg) est **un médicament vendu uniquement sur ordonnance du médecin**. La famotidine est un agent appartenant à la classe des antagonistes des récepteurs H₂ de l'histamine et qui réduit la quantité d'acide produite dans l'estomac. C'est la raison pour laquelle on l'emploie dans le traitement de certains ulcères de l'estomac ou du duodénum, ainsi que dans celui d'autres affections associées à une surproduction d'acide gastrique, comme le reflux gastro-œsophagien et le syndrome de Zollinger-Ellison.

Rappelez-vous — Ce médicament vous a été prescrit pour traiter un problème précis. **Ne l'employez pas pour traiter une autre affection et ne le partagez avec personne.**

N'utilisez pas de médicaments dont la date de péremption est échu.

Conservez tous vos médicaments hors de la portée et de la vue des enfants.

Lisez les renseignements qui suivent attentivement. **Si vous avez besoin d'explications ou d'informations complémentaires, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien.**

Ce qu'il faut savoir avant de prendre ce médicament : Il est possible que ce médicament ne convienne pas à certaines personnes. Par conséquent, si l'une des situations suivantes s'applique à vous, mentionnez-le à votre médecin.

- Ne prenez pas FAMOTIDINE si vous êtes allergique à l'un des ingrédients de la préparation ou à un autre antagoniste des récepteurs H₂.
- Vous êtes enceinte ou avez l'intention de le devenir.
- Vous donnez le sein à votre enfant ou avez l'intention de l'allaiter ainsi.
- Vous avez un diagnostic établi de maladie rénale ou hépatique.
- Votre médecin doit également savoir si vous prenez d'autres médicaments (p. ex. des médicaments d'ordonnance ou en vente libre).

Utilisation appropriée de ce médicament

- Prenez ce médicament **exactement** comme vous l'a prescrit le médecin. Pour le traitement des ulcères, on recommande souvent de prendre une seule dose au coucher, mais la posologie peut varier dans certains cas. Quoi qu'il en soit, suivez toujours les directives de votre médecin ou du pharmacien.
- Si cela s'avère nécessaire, votre médecin vous recommandera aussi de prendre un antiacide.
- Si vous avez oublié de prendre un comprimé, prenez-le dès que vous vous en apercevez, sauf si l'heure de votre prochaine dose approche. Si tel est le cas, prenez

seulement le prochain comprimé à l'heure habituelle. **Ne prenez pas deux fois plus de médicament pour vous rattraper.**

- **L'innocuité de la famotidine n'a pas été établie chez les enfants.**
- Suivez scrupuleusement les recommandations d'ordre alimentaire que le médecin vous a faites. Certains aliments et boissons, de même que certains médicaments, comme l'acide acétylsalicylique, peuvent irriter l'estomac et aggraver vos symptômes.
- Prenez ce médicament pendant toute la durée prescrite, même si vous commencez à vous sentir mieux, car la douleur disparaît généralement avant que la guérison ne soit complète. **Ne modifiez pas votre dose et ne mettez pas fin à votre traitement sans en avoir parlé avec votre médecin.**
- En règle générale, **FAMOTIDINE** ne perturbe pas l'action des autres médicaments que vous êtes susceptible de prendre. Il est important toutefois que le médecin soit informé des autres médicaments que vous prenez, même s'il s'agit de produits en vente libre.
- Conservez ce médicament entre 15 °C et 30 °C, dans un contenant hermétique opaque.
- Rangez les doses unitaires à l'abri de la lumière entre 15 °C et 25 °C.

Peut-on conduire ou utiliser des machines pendant le traitement par

FAMOTIDINE ?

Certains effets indésirables susceptibles de nuire à la capacité de conduire ou d'utiliser des machines ont été signalés avec la famotidine, par exemple des étourdissements.

Toutefois, comme la réponse à la famotidine peut varier d'un patient à l'autre, **on recommande que vous attendiez de savoir quelle est votre réaction à ce médicament avant de conduire ou d'utiliser des machines** (voir **Mesures à prendre en cas d'effets indésirables**).

Surdosage :

Si la personne dont vous prenez soin ou vous-même avez pris une trop grande quantité de FAMOTIDINE, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.

Mesures à prendre en cas d'effets indésirables : Outre leurs effets désirés, tous les médicaments peuvent avoir des effets secondaires. La plupart des patients qui prennent de la famotidine n'ont cependant aucun problème.

Si l'une des réactions suivantes se manifeste, mentionnez-le à votre médecin le plus tôt possible : maux de tête, étourdissements, diarrhée, constipation et problèmes hépatiques se manifestant par des symptômes tels que douleur abdominale, vomissements, fatigue et ictère (jaunissement des yeux et de la peau).

D'autres effets moins fréquents ont également été signalés, par exemple : sécheresse de la bouche, nausées et vomissements, malaises gastriques, perte d'appétit, fatigue, éruptions cutanées, démangeaisons, perte de cheveux, jaunisse, douleurs articulaires, crampes

musculaires, ainsi que troubles mentaux disparaissant avec l'arrêt du traitement. De très rares cas de convulsions ont été signalés chez des patients présentant des troubles rénaux.

Certaines personnes peuvent être allergiques à divers médicaments. Si l'une des réactions suivantes se manifeste après la prise de FAMOTIDINE, cessez de prendre ce médicament et communiquez avec votre médecin immédiatement : enflure du visage, des lèvres, de la langue et/ou de la gorge (accompagnée de difficulté à respirer ou à avaler), urticaire, réaction cutanée grave (de très rares cas sont survenus avec cette classe de médicament).

D'autres effets non mentionnés ci-dessus peuvent également survenir chez certains patients. Si vous remarquez la présence de l'un de ces effets ou avez des symptômes inhabituels, faites-en part à votre médecin.

Ingrédients : Ingrédient actif : Les comprimés FAMOTIDINE contiennent de la famotidine et sont offerts dans les teneurs suivantes : 20 mg (chamois) et 40 mg (brun pâle).

Ingrédients non médicinaux : amidon prégélifié, cellulose microcristalline, silice colloïdale et stéarate de magnésium. Enrobage : dioxyde de titane, hydroxypropylméthylcellulose, oxyde de fer jaune, oxyde de fer rouge, polyéthylèneglycol et polysorbate 80.

Signalement des effets indésirables

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés associés avec l'utilisation d'un produit de santé de l'une des deux façons suivantes :

- en visitant le site Web consacré à la déclaration des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou
- en composant sans frais le 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Pour de plus amples renseignements au sujet de FAMOTIDINE :

- Communiquez avec votre professionnel de la santé.
- Consultez la monographie complète de ce produit, rédigée à l'intention des professionnels de la santé et comprenant le présent feuillet de renseignements à l'intention des patients, en visitant le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>) ou celui du fabricant (www.sivem.ca). Vous pouvez également composer le 1 855-788-3153.

Ce dépliant a été rédigé par :

Sivem Produits Pharmaceutiques ULC
4705 rue Dobrin
Saint-Laurent, Québec, Canada
H4R 2P7

Dernière révision : 26 juin 2024