

RENSEIGNEMENTS DESTINÉS AUX PATIENTS

LISEZ CE DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

Pr **FLUCONAZOLE**

Comprimés de fluconazole

Lisez attentivement ce qui suit avant de commencer à prendre ou recevoir FLUCONAZOLE et chaque fois que votre ordonnance est renouvelée. Ce feuillet est un résumé et il ne contient donc pas tous les renseignements pertinents au sujet de ce produit. Discutez avec votre professionnel de la santé de votre maladie et de votre traitement et demandez-lui si de nouveaux renseignements sur FLUCONAZOLE sont disponibles.

Pourquoi utilise-t-on FLUCONAZOLE?

FLUCONAZOLE est employé pour traiter les infections fongiques, c'est-à-dire des infections qui sont causées par des champignons, comme les levures. FLUCONAZOLE peut aussi être utilisé pour vous empêcher d'attraper une infection fongique.

Comment FLUCONAZOLE agit-il?

FLUCONAZOLE appartient à une famille de médicaments appelés antifongiques. Il contribue à stopper la croissance des champignons.

Quels sont les ingrédients de FLUCONAZOLE?

Ingrédient médicamenteux : fluconazole

Ingrédients non médicinaux : cellulose microcristalline, phosphate dicalcique anhydre, povidone, croscarmellose sodique, rouge allura AC, laque d'aluminium et stéarate de magnésium.

FLUCONAZOLE se présente sous les formes pharmaceutiques suivantes :

Comprimés à 50 et à 100 mg

N'utilisez pas FLUCONAZOLE dans les cas suivants :

- si vous avez déjà fait une réaction allergique au fluconazole ou à n'importe lequel des autres ingrédients de FLUCONAZOLE (*voir* Quels sont les ingrédients de FLUCONAZOLE?);
- si vous avez déjà fait une réaction allergique à d'autres médicaments pour traiter une infection fongique;
- si vous prenez l'un ou l'autre des médicaments suivants :
 - érythromycine (un antibiotique pour traiter les infections);
 - pimozide (pour le traitement de la schizophrénie);
 - quinidine (un médicament utilisé pour traiter les battements de coeur irréguliers).

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre ou de recevoir FLUCONAZOLE, afin d'aider à éviter les effets secondaires et assurer la bonne utilisation du médicament. Informez votre professionnel de la santé de tous vos problèmes et états de santé, notamment dans les cas suivants :

- vous avez une maladie du foie ou des reins;
- la teneur de votre sang en potassium, en calcium ou en magnésium est anormale;
- vous avez des problèmes cardiaques, par exemple une anomalie du rythme cardiaque comme un allongement de l'intervalle QT;

Autres mises en garde

Grossesse et allaitement :

- Vous devez éviter de tomber enceinte pendant que vous prenez FLUCONAZOLE. Si vous êtes enceinte, croyez l'être ou songez à le devenir, parlez-en à votre professionnel de la santé.
- FLUCONAZOLE peut avoir des effets néfastes sur l'enfant à naître ou entraîner une fausse-couche.
- FLUCONAZOLE ne doit être utilisé pendant la grossesse que pour traiter des infections fongiques mettant la vie en danger.
- Si vous êtes capable d'avoir des enfants, vous devez employer un moyen de contraception efficace pendant le traitement par FLUCONAZOLE et pendant une semaine après la fin du traitement. Consultez votre professionnel de la santé pour connaître les moyens de contraception qui vous conviennent.
- Vous ne devez pas allaiter pendant le traitement, car FLUCONAZOLE passe dans le lait maternel. Si vous allaitez ou avez l'intention de le faire, consultez votre professionnel de la santé.

Graves problèmes cutanés : De graves problèmes cutanés, incluant le **syndrome de Stevens-Johnson** et la **toxidermie avec éosinophilie et symptômes généraux (syndrome DRESS)** sont survenus chez des personnes traitées par fluconazole. Ces affections cutanées sont plus susceptibles de se produire chez des personnes atteintes du sida ou d'un cancer. Dans de rares cas, elles se sont révélées mortelles. Si vous remarquez l'apparition d'une éruption cutanée pendant votre traitement par FLUCONAZOLE, avisez immédiatement votre professionnel de la santé. Consultez le tableau **Effets secondaires graves et mesures à prendre** ci-dessous pour obtenir de plus amples renseignements sur les effets secondaires graves.

Conduite de véhicules et utilisation de machines : FLUCONAZOLE peut causer des étourdissements ou des crises convulsives. Évitez de conduire ou d'utiliser des machines tant que vous ne savez pas comment vous réagissez à FLUCONAZOLE.

Mentionnez à votre professionnel de la santé tous les médicaments et produits de santé que vous prenez, y compris : médicaments d'ordonnance et en vente libre, vitamines, minéraux, suppléments naturels et produits de médecine douce.

Les produits ci-dessous pourraient interagir avec FLUCONAZOLE :

- abrocitinib (pour traiter une affection cutanée appelée « dermatite atopique » (un type d'eczéma)
- alfentanil, fentanyl ou méthadone (pour soulager la douleur)

- amiodarone (pour traiter les battements de cœur irréguliers)
- amitriptyline, nortriptyline (pour traiter la migraine et d'autres maladies)
- amphotéricine B et voriconazole (pour traiter les infections fongiques)
- anticoagulants de type coumarinique ou dérivés de l'indanedione (pour éclaircir le sang et empêcher la formation de caillots)
- anti-inflammatoires non stéroïdiens (comme l'acide acétylsalicylique [aspirine] et l'ibuprofène), qui sont utilisés pour soulager la douleur et faire baisser la fièvre
- benzodiazépines, p. ex., midazolam, triazolam ou médicaments similaires (pour aider à dormir ou soulager l'anxiété)
- bloqueurs des canaux calciques ou losartan (pour faire baisser la pression sanguine)
- carbamazépine ou phénytoïne (pour traiter l'épilepsie)
- célécoxib (pour traiter certaines formes d'arthrite et d'autres types de douleur)
- cimétidine (pour traiter les brûlures d'estomac et les ulcères gastroduodénaux)
- contraceptifs oraux
- cyclophosphamide ou alcaloïdes de la pervenche (pour traiter certaines formes de cancer)
- cyclosporine, sirolimus ou tacrolimus (pour prévenir le rejet d'organes)
- diurétiques (médicaments qui font uriner, comme l'hydrochlorothiazide, utilisés pour diminuer la rétention d'eau et abaisser la pression sanguine)
- halofantrine (pour traiter la malaria)
- ibrutinib (pour traiter certaines formes de cancer)
- ivacaftor (pour traiter la fibrose kystique)
- inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase (statines; pour abaisser le taux de cholestérol)
- lemborexant (pour traiter l'insomnie)
- lurasidone (pour traiter les troubles du cerveau)
- médicaments pour traiter les infections (antibiotiques), comme l'azithromycine, l'érythromycine, la rifampine ou la rifabutine
- olaparib (pour traiter certaines formes de cancer)
- prednisone (pour traiter de nombreux types de maladies inflammatoires et d'allergies)
- saquinavir ou zidovudine, aussi appelée AZT (pour traiter les patients atteints du VIH)
- sulfonyles et autres hypoglycémisants oraux (médicaments contre le diabète)
- théophylline (pour traiter l'asthme)
- tofacitinib (pour traiter la polyarthrite rhumatoïde)
- tolvaptan (pour traiter certaines maladies rénales)
- vitamine A (sous forme d'acide rétinoïque utilisé pour traiter l'acné)

Comment FLUCONAZOLE s'administre-t-il?

- Prenez FLUCONAZOLE tel que vous l'a prescrit votre médecin.

Dose habituelle :

Adultes : de 100 à 200 mg par jour

Votre professionnel de la santé déterminera la dose et la durée du traitement par FLUCONAZOLE d'après le type d'infection à soigner.

Enfants : Votre professionnel de la santé déterminera la dose et la durée du traitement par FLUCONAZOLE d'après le poids de l'enfant et le type d'infection à soigner.

Surdose :

Si vous pensez qu'une personne dont vous vous occupez ou que vous-même avez pris ou reçu une trop grande quantité de FLUCONAZOLE, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.

Dose omise :

Si vous oubliez une dose, prenez-la dès que possible. Toutefois, s'il est presque temps de prendre la dose suivante, sautez la dose oubliée et reprenez l'horaire posologique prescrit par votre médecin. Ne doublez pas la dose pour compenser la dose oubliée.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à FLUCONAZOLE?

Lorsque vous prenez ou recevez FLUCONAZOLE, vous pourriez présenter des effets secondaires qui ne sont pas mentionnés ci-dessous. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

- maux de tête;
- éruption cutanée;
- douleur au ventre;
- diarrhée;
- nausées et vomissements.

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme ou effet	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez de prendre ou de recevoir le médicament et obtenez immédiatement des soins médicaux
	Dans les cas Sévères seulement	Dans tous les cas	
TRÈS FRÉQUENT			
Problèmes cutanés (syndrome de Stevens-Johnson) : éruption cutanée, cloques, démangeaisons partout sur le corps, rougeur de la peau ou taches rouges qui démangent, gonflement des paupières, du visage ou des lèvres, desquamation (peau qui pèle)			✓
Toxidermie avec éosinophilie et symptômes généraux (syndrome DRESS) : éruption cutanée sévère, fièvre, enflure des ganglions		✓	
Problèmes de foie : douleur au			✓

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme ou effet	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez de prendre ou de recevoir le médicament et obtenez immédiatement des soins médicaux
	Dans les cas Sévères seulement	Dans tous les cas	
ventre, urine foncée, fièvre, selles de couleur pâle, jaunissement de la peau et du blanc des yeux			
FRÉQUENT			
Problèmes cardiaques (allongement de l'intervalle QT, torsades de pointes) : battements de cœur irréguliers, douleur à la poitrine, essoufflement, étourdissements, perte de conscience			✓
Réaction allergique : enflure du visage, de la gorge, de la bouche ou des extrémités, difficulté à respirer, éruption ou démangeaisons			✓

Si vous présentez un symptôme ou un effet secondaire incommodant qui n'est pas mentionné ici ou qui s'aggrave au point de perturber vos activités quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

<p>Déclaration des effets secondaires</p> <p>Vous pouvez déclarer des effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation d'un produit à Santé Canada en</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courriel, ou par télécopieur ; ou • Téléphonant sans frais 1-866-234-2345. <p><i>REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.</i></p>
--

Conservation :

Conservez FLUCONAZOLE entre 15 °C et 30 °C.
Garder hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir plus sur FLUCONAZOLE :

- Communiquez avec votre professionnel de la santé.

- Consultez la monographie intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les Renseignements destinés aux patients. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>), le site Web du fabricant à www.sivem.ca, ou peut être obtenu en composant le 1-855-788-3153.

Le présent feuillet a été rédigé par

Sivem Produits Pharmaceutiques ULC
4705 rue Dobrin
Saint-Laurent, Québec, Canada
H4R 2P7
www.sivem.ca

Dernière révision : 25 août 2023