

RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT POUR LE PATIENT

LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

Pr LISINOPRIL

Comprimés de lisinopril

Lisez ce qui suit attentivement avant de prendre **LISINOPRIL** et lors de chaque renouvellement de prescription. L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament. Discutez de votre état de santé et de votre traitement avec votre professionnel de la santé et demandez-lui s'il possède de nouveaux renseignements au sujet d'**LISINOPRIL**.

Mises en garde et précautions importantes

- LISINOPRIL ne doit pas être utilisé pendant la grossesse. Prendre ce médicament pendant la grossesse peut nuire à votre fœtus, et même causer sa mort. Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant que vous prenez LISINOPRIL, cessez de prendre le médicament et communiquez dès que possible avec votre professionnel de la santé.

Pour quoi LISINOPRIL est-il utilisé?

LISINOPRIL est utilisé chez les adultes :

- Pour traiter la tension artérielle (hypertension).
- Pour traiter l'insuffisance cardiaque avec d'autres médicaments, lorsque le cœur ne pompe pas le sang dans votre corps aussi bien qu'il le devrait.
- Pour réduire le risque de crise cardiaque (infarctus du myocarde) chez les patients ayant déjà fait une crise cardiaque.

LISINOPRIL est utilisé chez les enfants (âgés de 6 à 16 ans) pour traiter la tension artérielle.

Comment LISINOPRIL agit-il?

LISINOPRIL appartient à un groupe de médicaments appelés inhibiteurs de l'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA). Vous pouvez reconnaître les inhibiteurs de l'ECA au nom de leur ingrédient médicinal, qui finit par « **-PRIL** ».

LISINOPRIL agit en décontractant vos vaisseaux sanguins, ce qui permet à votre cœur de pomper plus facilement le sang dans toutes les parties de votre organisme. Cela aide à réduire la tension artérielle.

Ce médicament ne guérit pas votre maladie, mais aide plutôt à la maîtriser. Il est donc important de continuer à prendre LISINOPRIL régulièrement, même si vous vous sentez bien.

Quels sont les ingrédients dans LISINOPRIL?

Ingrédients médicinaux : Lisinopril

Ingrédients non médicinaux : Lactose anhydre, oxyde de fer rouge et stéarate de zinc.

LISINOPRIL est disponible sous les formes posologiques suivantes :

Comprimés : 5 mg, 10 mg et 20 mg.

Ne prenez pas LISINOPRIL si :

- Vous êtes allergique au lisinopril ou à tout ingrédient non médicinal de la préparation.
- Vous avez des antécédents familiaux d'œdème de Quincke (réaction allergique) ou avez déjà eu une réaction allergique à un autre inhibiteur de l'ECA. Assurez-vous d'informer votre professionnel de la santé que cela vous est arrivé.
- Vous prenez du sacubitril/valsartan (Entresto^{MD}), en raison d'un risque accru de réaction allergique grave, ce qui entraîne une enflure du visage ou de la gorge (œdème de Quincke) lorsqu'il est pris avec LISINOPRIL.
- Vous êtes enceinte ou avez l'intention de le devenir. Prendre LISINOPRIL pendant la grossesse peut nuire à votre fœtus, et même causer sa mort.
- Vous allaitez. LISINOPRIL passe dans le lait maternel.
- Vous prenez déjà un médicament abaissant la tension artérielle qui contient de l'aliskirène (tel que Rasilez) et présentez l'un des états suivants :
 - Diabète
 - Maladie des reins
 - Taux élevés de potassium
 - Insuffisance cardiaque accompagnée d'une faible tension artérielle
- Vous prenez un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine (ARA), un autre médicament pour traiter votre tension artérielle élevée ou un autre inhibiteur de l'ECA et présentez l'un des états suivants :
 - Diabète accompagné de lésions à des organes cibles
 - Maladie des reins
 - Taux élevés de potassium
 - Insuffisance cardiaque accompagnée d'une faible tension artérielle

Vous pouvez reconnaître les ARA au nom de leur ingrédient médicinal, qui finit par « - **SARTAN** ».

- Vous avez entre 6 et 16 ans et avez de graves problèmes de reins.

Consultez votre professionnel de la santé avant de prendre LISINOPRIL, afin de réduire la possibilité d'effets indésirables et pour assurer la bonne utilisation du médicament.

Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé, notamment :

- si vous êtes allergique à tout médicament utilisé pour abaisser la tension artérielle;
- si vous avez récemment reçu ou prévoyez recevoir une immunothérapie spécifique contre les piqûres d'abeille ou de guêpe;
- si vous présentez un rétrécissement d'une artère ou d'une valvule cardiaque;
- si vous avez subi une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral;
- si vous êtes atteint d'insuffisance cardiaque;
- si vous êtes atteint du diabète, ou d'une maladie du foie ou des reins;
- si vous êtes sous dialyse;
- si vous êtes déshydraté ou présentez des vomissements excessifs, de diarrhée ou de transpiration;
- si vous prenez un substitut de sel contenant du potassium, des suppléments de potassium ou un diurétique d'épargne potassique (un type spécifique de « pilule qui élimine l'eau »);
- si vous prenez un régime hyposodé;
- si vous prenez un médicament qui contient de l'aliskirène, tel que Rasilez, pour abaisser la tension artérielle. L'association avec LISINOPRIL n'est pas recommandée;
- si vous prenez un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine (ARA). Vous pouvez reconnaître les ARA au nom de leur ingrédient médicamenteux, qui finit par « **-SARTAN** »;
- si vous recevez des préparations injectables contenant de l'or (aurothiomalate sodique).

Autres mises en garde à connaître :

Surveillance : Pendant votre traitement avec LISINOPRIL, votre professionnel de la santé pourrait vérifier votre fonction rénale et hépatique, votre tension artérielle et la quantité d'électrolytes (p. ex. potassium) dans votre sang à intervalles réguliers.

Exposition au soleil : Vous pourriez développer une sensibilité au soleil en prenant LISINOPRIL. Vous devez vous exposer le moins possible au soleil jusqu'à ce que vous sachiez comment vous réagissez.

Utilisation de l'anesthésie : Si vous allez subir une intervention chirurgicale sous anesthésie, assurez-vous d'informer votre professionnel de la santé que vous prenez LISINOPRIL.

Conduite de véhicule et utilisation de machines : Avant d'effectuer des tâches pouvant nécessiter une attention particulière, attendez de savoir comment vous réagissez à LISINOPRIL. Des étourdissements, une sensation de tête légère ou des évanouissements peuvent se produire, particulièrement après la première dose ou après l'augmentation de la dose.

Mentionnez à votre professionnel de la santé toute la médication que vous prenez, y compris

les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits les médicaments alternatifs.

Interactions médicamenteuses graves

- Sacubitril/valsartan
- Médicaments contenant de l'aliskirène, des ARA ou d'autres inhibiteurs de l'ECA si vous avez également :
 - Diabète (avec ou sans lésions à des organes cibles)
 - Maladie des reins
 - Taux élevés de potassium, ou
 - Insuffisance cardiaque accompagnée d'une faible tension artérielle

Les produits qui suivent pourraient être associés à des interactions médicamenteuses avec LISINOPRIL :

- Agents augmentant le taux sérique de potassium, comme les substituts de sel contenant du potassium, les suppléments de potassium ou les diurétiques d'épargne potassique (un type spécifique de « pilule qui élimine l'eau »).
- Allopurinol utilisé pour traiter la goutte.
- Médicaments utilisés pour traiter le diabète tels que :
 - L'insuline
 - Médicaments appelés inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase IV (DPP-IV), notamment l'alogliptine, la linagliptine, la saxagliptine et la sitagliptine
 - Les autres médicaments par voie orale (comme les sulfonylurées)

Votre dose de ces types de médicaments pourrait devoir être modifiée si vous les prenez en même temps qu'LISINOPRIL.

- Médicaments utilisés pour traiter le cancer, comme le temsirolimus et l'évérolimus.
- De l'or pour le traitement de l'arthrite rhumatoïde.
- Le lithium utilisé pour traiter le trouble bipolaire.
- Les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), utilisés pour atténuer la douleur et l'enflure. Ceux-ci incluent l'ibuprofène, le naproxène et le célécoxib.
- Médicaments utilisés pour réduire la tension artérielle, notamment les diurétiques (« pilules qui éliminent l'eau »), les produits contenant de l'aliskirène (p. ex. Rasilez), ou les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine (ARA).
- Médicaments connus comme inhibiteurs de la cible mammifère de la rapamycine (mTOR) comme le sirolimus, un médicament utilisé pour prévenir le rejet d'organe après une greffe.
- Médicaments appelés activateur tissulaire du plasminogène (tPA), utilisés pour dissoudre les caillots de sang qui se sont formés dans les vaisseaux sanguins.
- Médicaments appelés inhibiteurs de l'endopeptidase neutre (NEP).

Comment prendre LISINOPRIL :

- Prenez LISINOPRIL exactement comme prescrit.
- Il est recommandé de prendre votre dose environ à la même heure chaque jour.
- Avalez le comprimé avec un verre d'eau. Il importe peu que vous preniez LISINOPRIL avec ou sans aliments.
- Ne cessez PAS de prendre LISINOPRIL, sauf sur indication contraire de votre professionnel de la santé, même si vous vous sentez bien.

Dose habituelle :

Votre professionnel de la santé a décidé de la dose la mieux adaptée à votre cas. Prenez votre dose une fois par jour, exactement comme votre professionnel de la santé vous l'a indiqué.

Surdosage :

Si vous pensez que vous ou une personne dont vous vous occupez avez pris trop d'LISINOPRIL, contactez immédiatement un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même en l'absence de symptômes.

Dose oubliée :

Si vous avez oublié de prendre votre dose durant la journée, prenez la dose suivante à l'heure habituelle. Ne prenez pas une double dose.

Quels sont les effets secondaires qui pourraient être associés à LISINOPRIL?

Voici certains des effets secondaires possibles que vous pourriez ressentir lorsque vous prenez LISINOPRIL. Si vous ressentez des effets secondaires qui ne font pas partie de cette liste, avisez votre professionnel de la santé.

Les effets secondaires peuvent inclure :

- Étourdissements (ou sensation de tête légère), somnolence, fatigue, maux de tête, faiblesse (perte de force)
- Toux, écoulement nasal
- Démangeaisons, psoriasis, douleur au sinus, éruptions cutanées, respiration sifflante
- Douleur abdominale, diarrhée, nausées, douleur à l'estomac et troubles digestifs, vomissements
- Confusion, somnolence ou insomnie, sautes d'humeur (y compris des signes de dépression), hallucinations visuelles et/ou auditives, rêves étranges
- Perturbation du goût ou de l'odorat, bouche sèche, engourdissement ou picotements dans les doigts ou les orteils

- Battements cardiaques rapides
- Impuissance
- Perte de cheveux

Chez les patients présentant une tension artérielle élevée, les cas d'évanouissement sont rares. Toutefois, ces cas peuvent être plus fréquents chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque.

Chez les patients atteints d'une maladie cardiaque coronarienne, une chute brutale de la tension artérielle peut survenir.

LISINOPRIL peut entraîner des résultats anormaux aux tests sanguins. Votre professionnel de la santé décidera du moment d'effectuer ces tests et interprétera les résultats.

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme / effet	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez de prendre des médicaments et obtenez de l'aide médicale immédiatement
	Seulement si l'effet est grave	Dans tous les cas	
COURANT			
Tension artérielle basse : étourdissement, évanouissements, sensation de tête légère. Peut survenir quand vous passez d'une position assise ou couchée à une position debout	√		
Hausse du taux de potassium dans le sang : battements cardiaques irréguliers, faiblesse musculaire et sensation de malaise général		√	
PEU COURANT			
Réaction allergique : éruptions cutanées, urticaire, enflure du visage, des lèvres, de la langue ou de la gorge, difficulté à avaler ou à respirer			√
Troubles des reins : changement dans la fréquence d'uriner, nausées, vomissements, enflure des extrémités, fatigue		√	

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme / effet	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez de prendre des médicaments et obtenez de l'aide médicale immédiatement
	Seulement si l'effet est grave	Dans tous les cas	
Troubles du foie et du pancréas : jaunissement de la peau et des yeux, urine foncée, douleur abdominale, nausées, vomissements, perte d'appétit		√	
Déséquilibre électrolytique : faiblesse, somnolence, douleurs ou crampes musculaires, battements cardiaques irréguliers		√	
RARE			
Anémie (diminution du nombre de globules rouges) : fatigue, perte d'énergie, faiblesse, essoufflement		√	
Diminution du nombre de plaquettes : ecchymoses, saignements, fatigue et faiblesse, petits points violets ou rouges sous la peau		√	
Diminution du nombre de globules blancs : infections, fatigue, fièvre, courbatures, douleurs et symptômes ressemblant à ceux de la grippe		√	
TRÈS RARE			
Réactions cutanées graves (syndrome de Stevens-Johnson, nécrose épidermique toxique) : toute combinaison de démangeaisons, d'éruptions cutanées, de rougeur, de vésication et de desquamation de la peau et/ou des lèvres, des yeux, de la bouche, des voies nasales ou des parties génitales, accompagnées de fièvre, de frissons, de maux de tête, de toux, de courbatures ou de douleurs aux articulations			√

En cas de symptôme ou d'effet secondaire gênant non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme ou d'effet secondaire vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez déclarer des effets secondaires soupçonnés d'être associés à l'utilisation d'un produit à Santé Canada en

- Visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour vous informer sur comment faire une déclaration en ligne, par courriel, ou par télécopieur; ou
- Téléphonant sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Entreposage :

Conserver à la température ambiante entre 15°C et 30°C.

Ne prenez pas votre médicament après la date de péremption imprimée sur la bouteille.

Garder hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir davantage au sujet d'LISINOPRIL :

- Communiquer avec votre professionnel de la santé.
- Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements sur le médicament pour le patient. Ce document est disponible sur le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>), le site Web du fabricant (www.sivem.ca) ou en composant le 1-855-788-3153.

Le présent dépliant a été rédigé par Sivem Produits Pharmaceutiques ULC.

Dernière révision : 04 septembre 2024

^{MD} Toutes les marques référencées dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.