

RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT POUR LE PATIENT

VEUILLEZ LIRE LE PRÉSENT DOCUMENT POUR UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

Pr **AMOXICILLIN**

Capsules d'amoxicilline

Veillez lire le présent dépliant attentivement avant de commencer à prendre **AMOXICILLIN**, puis chaque fois que vous faites renouveler votre ordonnance. Comme il ne s'agit que d'un résumé, ce dépliant ne contient pas tous les renseignements au sujet de ce médicament. Discutez de votre maladie et de son traitement avec votre professionnel de la santé, et demandez-lui s'il existe de nouveaux renseignements sur **AMOXICILLIN**.

À quoi AMOXICILLIN sert-il?

AMOXICILLIN est indiqué dans le traitement de certaines infections bactériennes. Il est aussi utilisé pour prévenir les infections :

- de la bouche, du nez, des amygdales et de la gorge;
- du cœur;
- dans une situation d'urgence.

Comment AMOXICILLIN agit-il?

AMOXICILLIN interfère avec la synthèse de la paroi cellulaire bactérienne. Il aidera à :

- interrompre la croissance des bactéries;
- éliminer les bactéries;
- réduire l'infection.

Certaines infections sont causées par des virus, comme celui du rhume ordinaire. **AMOXICILLIN** ne tue pas les virus.

Quels sont les ingrédients de AMOXICILLIN?

Ingrédient médicamenteux : amoxicilline (sous forme d'amoxicilline trihydratée)

Ingrédients non médicamenteux :

Capsules de 500 mg : Cellulose, microcristalline, stéarate de magnésium

Consultez votre médecin ou votre pharmacien pour savoir si l'un de ces ingrédients est susceptible de vous causer un problème médical si vous suivez un régime particulier ou si vous êtes allergique à une substance quelconque.

AMOXICILLIN est disponible sous les formes posologiques suivantes:

AMOXICILLIN est disponible sous forme de capsule.

- AMOXICILLIN en Capsules de 500 mg portant la mention « AMX » sur la coiffe bordeaux et "500" sur le corps jaune à l'encre noire.

Vous ne devez pas prendre AMOXICILLIN si :

- vous avez des allergies à ce médicament ou à l'un de ses ingrédients (voir Quels sont les ingrédients de AMOXICILLIN?);
- vous avez des allergies à des éléments du contenant;
- vous êtes allergique aux pénicillines, aux céphalosporines ou à un autre antibiotique similaire comme l'amoxicilline, l'ampicilline, la céphalexine ou tout autre;
- vous avez une mononucléose infectieuse (soupçonnée ou confirmée).

Avant de prendre AMOXICILLIN, consultez votre professionnel de la santé. Cela vous permettra d'en faire bon usage et d'éviter certains effets secondaires. Informez-le de tous vos problèmes de santé, en particulier si :

- Vous avez des antécédents de réactions d'hypersensibilité aux bêtalactamines (ampicilline, pipéracilline, etc). Voir la section Effets secondaires possibles de AMOXICILLIN ci-après.
- Vous prenez des anticoagulants (comme la warfarine).
- Vous avez des antécédents de diarrhée légère ou de colite influencée par l'emploi d'antibiotiques.
- Vous avez des problèmes rénaux.
- Vous êtes enceinte ou planifiez le devenir.
- Vous allaitez ou planifiez le faire. Consultez votre médecin pour savoir comment nourrir votre enfant durant votre traitement par **AMOXICILLIN**.

Informez votre professionnel de la santé de tous les médicaments que vous prenez, qu'il s'agisse de produits d'ordonnance ou en vente libre, de vitamines, de minéraux, de suppléments naturels ou encore de produits de médecine douce.

Les produits ci-dessous pourraient interagir avec AMOXICILLIN :

- Agent anticancéreux (comme le méthotrexate);
- Médicaments contre les brûlures d'estomac ou la goutte (comme le probénécide, la cimétidine, etc.);

- Anticoagulants (comme la warfarine, etc.), utilisés pour éclaircir le sang et prévenir la formation de caillots sanguins – ces agents pourraient vous prédisposer à des troubles de saignements;
- Contraceptifs oraux (réduction possible de l'efficacité du contraceptif oral);
- Antibactériens (comme les tétracyclines) – réduction possible de l'efficacité d'AMOXICILLIN.

Utilisation de AMOXICILLIN

Les antibiotiques comme AMOXICILLIN sont utilisés pour traiter les infections bactériennes seulement. Ils ne sont pas efficaces contre les infections virales comme le rhume. Bien que vous puissiez vous sentir mieux dès les premiers jours du traitement, il est important de continuer à prendre AMOXICILLIN en suivant les instructions à la lettre. L'utilisation abusive ou inappropriée de AMOXICILLIN peut favoriser la croissance de bactéries qui ne seront pas éliminées par AMOXICILLIN (résistance), ce qui signifie que ce médicament pourrait ne pas fonctionner pour vous en cas d'utilisation ultérieure.

Ne partagez pas votre médicament.

Informez votre pharmacien des autres produits que vous prenez, car certains médicaments pourraient affecter la façon dont votre organisme absorbe AMOXICILLIN.

Dose habituelle chez l'adulte :

Pour le traitement des infections : 500 mg toutes les 8 heures ou une dose unique de 3 g.

Pour la prévention des infections : 3 g en une seule fois avant l'intervention, suivis de 1,5 g toutes les 6 heures.

Dose habituelle chez l'enfant :

Votre médecin établira la dose d'AMOXICILLIN que vous devez administrer à votre enfant en fonction de son poids et de la gravité de l'infection. La dose pour les enfants ne doit pas dépasser la dose recommandée pour les adultes. Pour les enfants de plus de 20 kg, il faut utiliser la dose pour adultes.

Ce médicament se prend par la bouche, selon les directives de votre médecin.

Administrer AMOXICILLIN entre les repas, avec un verre d'eau.

Si votre état ne s'améliore pas, faites-le savoir à votre médecin.

Surdosage

Si vous pensez que vous-même ou une personne dont vous vous occupez avez pris une dose trop élevée d'**AMOXICILLIN**, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service d'urgence d'un hôpital ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.

Les symptômes d'un surdosage peuvent comprendre : un étourdissement grave.

Dose oubliée

Si vous avez oublié de prendre votre dose, prenez-la dès que vous y pensez, sauf si l'heure de la prochaine dose approche. Si c'est le cas, laissez tomber la dose oubliée et poursuivez votre traitement selon l'horaire habituel. Ne doublez pas la dose pour compenser celle que vous avez omise.

Effets secondaires possibles d'AMOXICILLIN

La liste qui suit ne contient que quelques-uns des effets secondaires possibles d'**AMOXICILLIN**. Si vous ressentez un effet secondaire qui n'y figure pas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme/Effet	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez de prendre le médicament et obtenez des soins médicaux d'urgence
	Dans les cas graves seulement	Dans tous les cas	
FRÉQUENTS			
Éruption cutanée			✓
Éruption cutanée ou autre réaction dermatologique ou oculaire			✓
Nausées.			✓
Vomissements			✓
Diarrhée			✓
Présence de sang dans les selles			✓
Glossite (langue noire villeuse)		✓	
Décoloration des dents chez les enfants (coloration brune, jaune ou grise des dents)		✓	
Étourdissements (sensation de tête légère).		✓	
Anxiété		✓	
PEU FRÉQUENTS			

Effets secondaires graves et mesures à prendre			
Symptôme/Effet	Consultez votre professionnel de la santé		Cessez de prendre le médicament et obtenez des soins médicaux d'urgence
	Dans les cas graves seulement	Dans tous les cas	
Urticaire, démangeaisons		✓	
Éruption rougeâtre sur le visage		✓	
Œdème		✓	
Anaphylaxie (réactions allergiques graves comme gonflement du nez, des yeux, de la gorge, respiration difficile, réactions cutanées graves, telles que formation d'ampoules, éruption cutanée, desquamation)			✓
Troubles rénaux (comme une urine trouble)			✓
Troubles hépatiques (comme des nausées/vomissements persistants, douleur gastrique/abdominale, fatigue inhabituelle, coloration jaune de la peau et des yeux (jaunisse), urine foncée			✓
RARES			
Réactions cutanées graves (symptômes semblables à ceux de la grippe), peau qui pèle et cloques).			✓
Difficulté à s'endormir (insomnie)		✓	
Confusion ou changements du comportement		✓	
Changements des résultats hématologiques		✓	
Réactions cutanées graves (pouvant toucher d'autres organes) : desquamation de la peau ou apparition de cloques sur la peau (avec ou sans pus) qui peuvent aussi toucher les yeux, la bouche, le nez ou les organes génitaux, démangeaisons, éruption cutanée grave, bosses sous la peau, douleur cutanée, changements de couleur de la peau (rougeâtre, jaunâtre ou bleuâtre); Enflure ou rougeur des yeux ou du visage; Symptômes pseudogrippaux, fièvre, frissons, courbatures, enflure des glandes, toux; Essoufflement, douleur thoracique ou malaise.			✓
FRÉQUENCE INCONNUE			
Méningite aseptique (inflammation non bactérienne de la membrane qui protège le cerveau) : Confusion, fièvre, nausées, fatigue, maux de tête soudains ou raideur de la nuque, sensibilité à la lumière, vomissements.			✓

Si vous éprouvez un symptôme ou un effet secondaire qui ne figure pas dans cette liste ou qui devient gênant au point de vous empêcher de vaquer à vos occupations quotidiennes, parlez-en à votre professionnel de la santé.

Signalement des effets indésirables

Vous pouvez déclarer les effets secondaires soupçonnés d'être associés avec l'utilisation d'un produit de santé de l'une des deux façons suivantes :

- en visitant le site Web consacré à la déclaration des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou
- en composant sans frais le 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

Conservation

Conservez à température ambiante entre 15 °C et 30 °C.

N'utilisez pas ce médicament une fois la date de péremption dépassée. En règle générale, tous les produits périmés doivent être retournés à votre pharmacien. Rangez ce médicament hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour de plus amples renseignements au sujet d'AMOXICILLIN :

- Communiquez avec votre professionnel de la santé.
- Consultez la monographie complète de ce produit, rédigée à l'intention des professionnels de la santé et comprenant les présents renseignements sur le médicament, à l'intention des patients, en visitant le site Web de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medicaments/base-donnees-produits-pharmaceutiques.html>) ou celui du fabricant (www.sivem.ca), en composant le 1-855-788-3153.

Le présent dépliant a été rédigé par Sivem Produits Pharmaceutiques ULC, rue Dobrin, Saint-Laurent, Québec, Canada, H4R 2P7.

Dernière révision : 24 juillet 2024